

Morphologie	Orientation étiologique
Fine, « pulvérulente »	pityriasis versicolor <u>img_11_68.jpg</u>
Furfuracée, grasse	dermite séborrhéique <u>img_11_9.jpg</u>
	lymphome cutané <u>img_11_69.jpg</u>
	« dartres »
Sèche	
Micacée (= adhérente, nacrée et stratifiée avec un signe de la tâche de bougie au frottement puis apparition après décollement de la dernière squame translucide d'un piqueté hémorragique = signe de la rosée sanglante d'Auspitz) et bien limitée	Psoriasis <u>img_11_14.jpg</u>
Détachable en un bloc, en « pain à cacheter »	Parapsoriasis en gouttes
En collerette, se décollant en périphérie	Pityriasis rosé de Gibert <u>img_11_71.jpg</u>
	Syphilis secondaire <u>img_11_72.jpg</u>
Polymorphe, mal limitée, avec aspect suintant ou croûteux (squame-croûte)	Eczéma (fig69), <u>img_11_73.jpg</u>
	Psoriasis pustuleux <u>img_11_74.jpg</u>
« en doigts de gants », avec desquamation en lambeaux, à prédominance acrale	scarlatine, maladie de Kawasaki, toxidermie <u>img_11_75.jpg</u>
Folliculaire, de petite taille, en semis, siégeant à l'émergence d'un poil	pityriasis rubra pilaire <u>img_11_8.jpg</u>
« en écaille de poisson », râpeuse	ichtyose <u>img_11_66.jpg</u>