

	<i>Siège de la lésion</i>	Syndrome pyramidal	Trouble sensitif Lemniscal (anomalies pallesthésie/position/tact fin)	Trouble sensitif Spinothalamique (hypoesthésie thermoalgique)	Troubles génito-sphinctériens (impuissance, incontinence, rétention)
<b>Médullaire complet</b>	<i>Global <u>img_5_20.jpg</u></i>	+ au dessous de la lésion tétraplégie (lésion cervicale) ou paraplégie (lésion thoracique ou lombaire)	Présent avec niveau sensitif	Présent avec niveau sensitif	Présent
<b>Cordonal dorsal</b>	<i>Postérieur <u>img_5_21.jpg</u></i>	Absent	Présent , au dessous de la lésion homolatéral si lésion unilatérale, bilatéral si lésion médiane <u>signe de Lhermitte</u> (paresthésies lors de la flexion de la nuque)	Absent	Absent
<b>Spino-thalamique</b>	<i>Antéro-latéral <u>img_5_22.jpg</u></i>	Absent	Absent	Présent , au dessous de la lésion controlatéral	Absent
<b>Brown-Sequard</b>	<i>Hémi-moelle <u>img_5_23.jpg</u></i>	Présent au dessous de la lésion, homolatéral	Présent , au dessous de la lésion, homolatéral	Présent , au dessous de la lésion, controlatéral	Absent
<b>Syringomyélique</b>	<i>Centro-médullaire <u>img_5_24.jpg</u></i>	Absent	Absent	+ , suspendu, uni ou bilatéraux <u>img_5_25.jpg</u>	Absent