

	<i>Siège de la lésion</i>	Troubles moteurs	Troubles sensitifs	Nerfs crâniens	Signes cérébelleux	Sympathique
<b>Atteinte pédonculaire</b>	<u><i>img_5_30.jpg</i></u>	hémiplégie massive <b>touchant</b> la face (ou syndrome cérébelleux statique si lésion latérale haute)	± simple hémihypoesthésie globable	<b>III</b> ± paralysie de la latéralité supra-nucléaire (déviation conjuguée des yeux vers le côté sain)	± syndrome cérébelleux statique unilatéral (lésion latérale basse)	Absent
<b>Atteinte pontique</b>	<u><i>img_5_31.jpg</i></u>	hémiplégie - <b>touchant</b> la face si lésion au dessus du noyau du VII - <b>respectant</b> la face si lésion au dessous du noyau du VII	± hémianesthésie dissociée soit thermoalgique (température, douleur), soit lemniscale (position, diapason, tact fin)	(V), <b>VI</b> , <b>VII</b> + paralysie de la latéralité nucléaire (déviation conjuguée des yeux vers le côté paralysé)	±, syndrome cérébelleux cinétique unilatéral	Absent
<b>Atteinte bulbaire paramédiane</b>	<u><i>img_5_32.jpg</i></u>	hémiplégie massive <b>respectant</b> la face	± hémianesthésie lemniscale (position, diapason, tact fin)	<b>XII</b>	Absent	Absent
<b>Atteinte bulbaire latérale (Wallenberg)</b>	<u><i>img_5_32.jpg</i></u>	Absent	hémianesthésie thermoalgique respectant la face	<b>V</b> + <b>IX</b> , <b>X</b> , <b>XI</b> + <b>VIII</b>	+, syndrome cérébelleux statique unilatéral	+, signe de Claude-Bernard-Horner