

Syndromes	Troubles moteurs	Troubles sensitifs	Troubles sensoriels	Troubles des fonctions supérieures	Crises d'épilepsie partielles
<b>Rolandique</b> (lésion du gyrus précentral et du gyrus postcentral autour du sillon central de Rolando)	Hémiplégie incomplète et non proportionnelle ± Paralyse de la latéralité du regard supra-nucléaire (regarde sa lésion).	Hémihypoesthésie non proportionnelle (superposable au déficit moteur) Prédominant sur la sensibilité profonde	Absent	① ± Aphasie de Broca si lésion de l'hémisphère dominant. ② ± Syndrome de l'hémisphère mineur si lésion de l'hémisphère non dominant.	Crises somatomotrices (Bravais-Jacksonienne) : mouvements cloniques débutant au membre supérieur ou inférieur ou à la face, pouvant rester localisée ou s'étendre à tout l'hémicorps ou ② Crises sensitives
<b>Pariétal</b>	Absent	Hémihypoesthésie non proportionnelle Prédominant sur la sensibilité proprioceptive et discriminatoire.	Hémianopsie latérale homonyme ou Quadranopsie latérale homonyme inférieure	① Aphasie de Wernicke si lésion de l'hémisphère dominant. ② Syndrome de l'hémisphère mineur si lésion de l'hémisphère mineur. ③ Apraxie : si lésion de l'hémisphère dominant	Crises sensitives : paresthésies débutant au membre supérieur ou inférieur ou à la face, pouvant rester localisées ou s'étendre à tout l'hémicorps.
<b>Temporal</b>	Absent	Absent	Quadranopsie latérale homonyme supérieure	① Aphasie de Wernicke si lésion de l'hémisphère dominant.	Crises temporales simples : dysmnésie, signes végétatifs, sensation épigastrique ascendante, hallucinations auditives ou olfactives Crises complexes : suspension de la conscience et automatismes (mâchonnement, activité gestuelle).
<b>Occipital</b>	Absent	Absent	① Hémianopsie latérale homonyme avec épargne de la vision maculaire ② Cécité corticale ③ Agnosies visuelles : des couleurs, prosopagnosie		Crises visuelles : illusions ou hallucinations visuelles (simples ou complexes), déviation des yeux