

	Examen	Anomalie	Orientation étiologique
Manipulation concrète d'objets (gestes transitifs)	<ul style="list-style-type: none"> - simple : utiliser un peigne, une brosse à dents, une fourchette,... - complexe : faire un paquet cadeau,... 	Apraxie idéatoire (bilatérale)	<ul style="list-style-type: none"> - lésion pariétale gauche étendue chez un droitier - lésions hémisphériques bilatérales.
Exécution de gestes sans utilisation d'objets (gestes intransitifs)	<ul style="list-style-type: none"> - exécuter des gestes symboliques : signe de croix, salut militaire,... - mimés : enfoncer un clou, repasser, se brosser les dents,... - arbitraires mimés : les doigts en anneaux croisés 	Apraxie idéo-motrice (bilatérale le plus souvent) = geste imparfait alors que le geste est normal lorsque le patient a le droit d'utiliser réellement l'objet.	<ul style="list-style-type: none"> - lésion pariétale gauche étendue chez un droitier
Exécution de séquences arbitraires et de gestes contrariés	<ul style="list-style-type: none"> - épreuve poing-paume-tranche - gestes contrariés : le patient doit fermer un poing et ouvrir l'autre main simultanément, puis alterner plusieurs fois 	Apraxie dynamique : persévérations gestuelles et/ou incapacité de soumettre l'action à un plan.	<ul style="list-style-type: none"> - syndrome frontal
Activités graphiques et constructives	<ul style="list-style-type: none"> - écriture spontanée puis dictée. - dessin spontané puis copié (triangle, marguerite, horloge) - dessin d'une frise faisant alterner des formes carrées et triangulaires. 	Apraxie constructive : utilisation défectueuse de la page ; lettres, mots, dessins réalisés par morceaux, sans structure.	<ul style="list-style-type: none"> - syndrome pariétal - lésions du corps calleux.
Examen de l'habillement	<ul style="list-style-type: none"> - faire se déshabiller et s'habiller 	Apraxie de l'habillement : le patient n'arrive plus à s'habiller.	<ul style="list-style-type: none"> - syndrome pariétal